

УДК 517.5

А. В. ДОВЖЕНКО, П. І. КОГУТ

## Ері-НАПІВНЕПЕРЕРВНІ ЗНИЗУ ВІДОБРАЖЕННЯ ТА ЇХ ВЛАСТИВОСТІ

A. V. Dovzhenko, P. I. Kogut. *Epi-lower semicontinuous mappings and their properties*, Mat. Stud. **36** (2011), ?-?.

We present a new concept of lower semicontinuity for vector-valued mappings, so-called lower epi-semicontinuity, which is closely related with the sequential closedness of epigraphs of these mappings. We consider the case when the mappings take values in a real Banach space  $Y$  partially ordered by a closed convex pointed cone  $\Lambda$ , and we make no additional assumptions on topological interior of the ordering cone. We also study the comparison of the lower epi-semicontinuity with the classical notion of lower semicontinuity and its generalizations.

А. В. Довженко, П. І. Когут. *Ері-полунеперервні снизу отображения и их свойства* // Мат. Студії. – 2011. – Т.36, №1. – С.?-?.

Пусть  $f$  — векторнозначное отображение, действующее в полуупорядоченное замкнутым выпуклым заостренным конусом  $\Lambda$  действительное банахово пространство  $Y^\bullet$ . Для таких отображений вводится понятие ері-полунеперервности снизу (ері-пн.сн.). Изучены свойства ері-пн.сн. отображений и их взаимосвязь с классом отображений, имеющих секвенциально замкнутый надграфик. Установлены соотношения между существующими концепциями полунеперервности снизу.

**1. Вступ.** Одним із найбільш відомих результатів класичного аналізу, який тісно пов'язаний з двадцятою проблемою Гільберта щодо існування розв'язків задач варіаційного числення, є наступний: нехай  $(X, \tau)$  — топологічний простір, який задовольняє першу аксіому зліченності,  $f: X \rightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$  — довільна функція. Тоді є еквівалентними наступні твердження:

- (i) для довільного  $x \in X$  і довільної послідовності  $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ , яка  $\tau$ -збігається до  $x$  при  $n \rightarrow \infty$ , справедливо  $f(x) \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} f(x_n) := \lim_{n \rightarrow \infty} \inf_{i \geq n} f(x_i)$ ;
- (ii) надграфік функції  $f$ , тобто множина  $\text{epi} = \{(x, \lambda) \in X \times \mathbb{R} : \lambda \geq f(x)\}$ , є замкненим в просторі  $X \times \mathbb{R}$ .

Власне, кожне з цих тверджень може виступати як самостійне означення такого поняття як напівнеперервність знизу функції  $f: X \rightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ .

Проблема, яка розглядається в даній роботі, безпосередньо пов'язана з узагальненням даного результату на випадок, коли  $f$  є відображенням простору  $X$  в частково упорядкований за деяким конусом  $\Lambda$  нормований простір  $Y$ . Відомо, що класична концепція напівнеперервності знизу (див. пункт (i)) має декілька, загалом незалежних, узагальнень на векторнозначний випадок. Зокрема, це такі поняття як напівнеперервність знизу за конусом, квазі-напівнеперервність знизу, порядкова напівнеперервність,

2010 *Mathematics Subject Classification*: 46A30, 46B40.

$\Lambda$ -напівнеперервність знизу та інші (див., напр., [5, 7, 9, 10]). Кожна з таких характеристик, відіграє вагомую роль в питаннях розв'язності відповідних задач векторної оптимізації. Проте, що стосується їх зв'язку з замкненістю надграфіка відповідного відображення, то в загальному випадку, такої еквівалентності не має, оскільки операція замикання надграфіка відображень типу  $f: X \rightarrow Y$  може породжувати множину, яка вже не є надграфіком для жодного відображення. Загалом, має місце наступна діаграма:



Як видно з наведеної діаграми, квазі-напівнеперервність знизу гарантує замкненість відповідного надграфіка лише за умови, коли внутрішність конуса, який задає частковий порядок, є непорожньою. Проте, ця умова є досить обмежливою, особливо для випадку нескінченно вимірних просторів  $Y$ . Наприклад, якщо  $Y = L^p(\Omega)$ , де  $p \in [1, \infty)$ , а  $\Lambda$  є конусом додатних елементів в  $L^p(\Omega)$ , то  $\text{int } \Lambda = \emptyset$ . В зв'язку з цим дана робота ставить за мету ввести нову концепцію напівнеперервності знизу для векторнозначних відображень, яка була б узгодженою з замкненістю надграфіків таких відображень і була вільною від припущення  $\text{int } \Lambda \neq \emptyset$ . Такі відображення в роботі названі ері-напівнеперервними знизу. Окреслено клас таких відображень, досліджено основні їх властивості та наведено порівняльний аналіз з іншими класами напівнеперервних знизу відображень. Всі базові положення ілюстровано модельними прикладами.

**2. Основні поняття та попередні результати.** Нехай  $X$  та  $Y$  — пара дійсних нормованих просторів. Нехай  $Y$  є топологічно двоїтим простором до сепарабельного нормованого простору  $V$ . Наділимо простір  $X$  топологією норми  $\|\cdot\|_X$ , а простір  $Y$   $*$ -слабкою топологією  $\tau = \sigma(Y; V)$ , відповідно. Як відомо, топологія норми  $\|\cdot\|_Y$  в  $Y$  не є узгодженою з двоїстістю. Отже, замкнена опукла множина в  $Y$  є, в загальному випадку, незамкненою в  $*$ -слабкій топології. Для довільної підмножини  $A$  простору  $Y$  через  $\text{int}_\tau A$  та  $\text{cl}_\tau A$  будемо позначати її внутрішність та замикання відносно  $\tau$ -топології, відповідно. Будемо казати, що послідовність пар  $\{(x_n, y_n)\}_n \subset X \times Y$   $\mu$ -збігається в  $X \times Y$  до пари  $(x_0, y_0)$ , якщо  $x_n \rightarrow x_0$  сильно в  $X$ ,  $y_n \xrightarrow{\tau} y_0$  в  $Y$ .

**Означення 1.** Множину  $A \subset X \times Y^*$  будемо називати *секвенціально  $\mu$ -замкненою*, якщо для довільної послідовності її елементів  $\{(x_n, y_n)\}_{n \in \mathbb{N}}$  всі її часткові границі також належать  $A$ .

Нехай  $\Lambda$  — опуклий  $\tau$ -замкнений загострений конус в  $Y$ . Загостреність конуса означає, що  $\Lambda + (-\Lambda) = \{0_Y\}$ . Надалі вважатимемо, що простір  $Y$  є частково впорядкованим за конусом  $\Lambda$ . При цьому відношення часткового порядку, яке породжене конусом  $\Lambda$ , будемо позначати як  $\preceq_\Lambda$ . Отже, елементи  $y, z$  простору  $Y$  знаходяться у відношенні  $y \preceq_\Lambda z$ , якщо  $z \in y + \Lambda$ .

**Означення 2.** Елемент  $z \in Y$  називається *точною нижньою гранню* множини  $A \subset Y$  (далі  $z = \inf_\Lambda A$ ), якщо: 1)  $z \preceq_\Lambda y, \forall y \in A$ ; 2) з того, що  $w \preceq_\Lambda y$  для деякого  $w \in Y$  та  $\forall y \in A$ , випливає:  $w \preceq_\Lambda z$ . Елемент  $z \in Y$  називається  $\Lambda$ -*мінімальним елементом* множини  $A \subset Y$ , якщо  $(z - \Lambda) \cap A = z$ .

Зауважимо, що, на відміну від скалярного випадку, в частково впорядкованих просторах точна нижня грань множини може не належати її замиканню в обраній топології. Дійсно, нехай  $Y = \mathbb{R}^2$  і  $\Lambda = \mathbb{R}_+^2$  — конус додатних елементів в  $\mathbb{R}^2$ . Нехай  $A = \{(0, 2), (2, 0)\}$ . Тоді, легко бачити, що  $\inf_{\mathbb{R}_+^2} A = (0, 0)$ .

**Означення 3.** Будемо казати, що множина  $A \subset Y$  обмежена зверху (знизу) за конусом  $\Lambda$ , якщо існує елемент  $b \in Y$  такий, що  $a \preceq_{\Lambda} b, \forall a \in A$  ( $a \succeq_{\Lambda} b, \forall a \in A$ ).

**Означення 4** ([4]). Множина всіх  $\Lambda$ -мінімальних елементів множини  $A \in Y$  називається *ефективним  $\Lambda$ -мінімумом* множини  $A$  і позначається як  $\Lambda\text{-Min } A$ .

Позначимо через  $\{-\infty_{\Lambda}\}$  та  $\{+\infty_{\Lambda}\}$  пару невластних елементів простору  $Y$ , які задовольняють умову:  $-\infty_{\Lambda} \preceq_{\Lambda} y \preceq_{\Lambda} +\infty_{\Lambda}, \forall y \in Y$ . Надалі вважатимемо, що  $(+\infty_{\Lambda}) + (-\infty_{\Lambda}) = 0_Y$ . Нехай  $Y^{\bullet}$  — напіврозширений простір  $Y \cup \{+\infty_{\Lambda}\}$ . Тоді  $Y^{\bullet}$  залишається нормованим простором, якщо покласти  $\|+\infty_{\Lambda}\|_Y = +\infty$  та  $y + \alpha(+\infty_{\Lambda}) = +\infty_{\Lambda}, \forall y \in Y, \forall \alpha \in \mathbb{R}_+$ .

Якщо множина  $A \subset Y$  не є обмеженою знизу за конусом, то будемо вважати, що  $\inf_{\Lambda} A = -\infty_{\Lambda}$ .

**Означення 5.** Будемо казати, що послідовність  $\{y_n\}_{n \in \mathbb{N}}$  з простору  $Y$   $\tau$ -збігається до елемента  $\{-\infty_{\Lambda}\}$ , якщо  $\inf_{\Lambda} \{y_n\}_{n \in \mathbb{N}} = -\infty_{\Lambda}$ .

Суттєвим розширенням поняття ефективного  $\Lambda$ -мінімуму є наступна концепція:

**Означення 6** ([4]). *Ефективним  $\Lambda_{\tau}$ -мінімумом* множини  $A \subset Y$  називається множина  $\Lambda$ -мінімальних елементів замикання множини  $A$  в топології  $\tau$ , у разі коли вона не є порожньою, і  $\{-\infty_{\Lambda}\}$  в іншому випадку:

$$\Lambda_{\tau}\text{-Min } A = \begin{cases} \Lambda\text{-Min } (\text{cl}_{\tau} A), & \Lambda\text{-Min } (\text{cl}_{\tau} A) \neq \emptyset \\ \{-\infty_{\Lambda}\}, & \text{в іншому випадку.} \end{cases} \quad (1)$$

Нехай  $X_{\partial}$  — непорожня підмножина простору  $X$ , а  $f: X_{\partial} \rightarrow Y$  — довільне відображення. Нехай  $\{y_n\}_{n \in \mathbb{N}}$  — послідовність в просторі  $Y$ . Множину всіх її часткових границь в  $\tau$ -топології простору  $Y$  будемо позначати через  $L^{\tau} \{y_n\}$ . Отже, якщо  $y \in L^{\tau} \{y_n\}$ , то існує підпослідовність  $\{y_{n_i}\}_{i \in \mathbb{N}} \subset \{y_n\}_n$  така, що  $y_{n_i} \xrightarrow{\tau} y$  в  $Y$  при  $i \rightarrow \infty$ .

Для довільного  $f: X_{\partial} \rightarrow Y$  та фіксованої точки  $x_0 \in X_{\partial}$  введемо до розгляду множину:

$$L^{\mu}(f, x_0) := \bigcup_{\{x_k\}_{k \in \mathbb{N}} \in \mathfrak{M}(x_0)} L^{\tau} \{f(x_k)\}, \quad (2)$$

де через  $\mathfrak{M}(x_0)$  позначено сукупність всіх послідовностей  $\{x_k\}_{k \in \mathbb{N}} \subset X_{\partial}$ , які сильно збігаються до  $x_0$  в просторі  $X$ .

Як впливає з наведених вище означень, для відображення  $f$ , яке необмежене знизу за конусом в околі деякої точки  $x_0$ , множина  $L^{\mu}(f, x_0)$  містить невластний елемент  $\{-\infty_{\Lambda}\}$ . Надалі будь-яке відображення  $f: X_{\partial} \rightarrow Y$  будемо пов'язувати з його розширенням  $\widehat{f}: X \rightarrow Y^{\bullet}$  на весь простір  $X$  за правилом

$$\widehat{f}(x) = \begin{cases} f(x), & x \in X_{\partial}, \\ +\infty_{\Lambda}, & x \notin X_{\partial}. \end{cases}$$

**Означення 7.** Будемо казати, що відображення  $f: X \rightarrow Y^\bullet$  є *обмеженим знизу (зверху)* в точці  $x_0$ , якщо для будь-якої збіжної до  $x_0$  послідовності  $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$  відповідна послідовність значень  $\{f(x_n)\}_{n \in \mathbb{N}}$  є обмеженою знизу(зверху) за конусом.

**3. Властивість напівнеперервності та її узагальнення.** В цьому параграфі наведемо короткий огляд найбільш відомих понять та результатів, які пов'язані з узагальненням концепції напівнеперервності знизу (нн.зн.) для векторнозначних відображень  $f: X \rightarrow Y^\bullet$ . Нехай  $f: X \rightarrow Y^\bullet$  — довільне відображення. Пов'яжемо з ним його надграфік

$$\text{epi}f := \{(x, y) \in X \times Y^\bullet \mid f(x) \preceq_\Lambda y\}. \quad (3)$$

Як відомо, концепція напівнеперервності знизу скалярних функцій тісно пов'язана з властивістю замкненості їх надграфіків, а саме функція  $f: X \rightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$  є нн.зн. тоді і тільки тоді, коли її надграфік є замкненою множиною. Проте, подібне твердження для випадку векторнозначних відображень  $f: X \rightarrow Y^\bullet$  є, загалом, хибним. Більше того, узагальнення концепції напівнеперервності знизу на випадок відображень, які діють в частково упорядковані векторні простори, є неоднозначним. До найбільш відомих таких узагальнень можна віднести наступні:

**Означення 8** ([9]). Відображення  $f: X \rightarrow Y^\bullet$  називається *секвенціально напівнеперервним знизу (ск.нн.зн.)* в точці  $x_0 \in X$ , якщо для довільного  $y \preceq_\Lambda f(x_0)$  та для будь-якої послідовності  $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subseteq X$ , яка сильно збігається до  $x_0$ , існує  $\tau$ -збіжна до  $y$  послідовність  $\{y_k\}_{k \in \mathbb{N}} \subset Y$  така, що  $y_k \preceq_\Lambda f(x_k) \quad \forall k \in \mathbb{N}$ .

**Означення 9** ([5]). Відображення  $f: X \rightarrow Y^\bullet$  називається *квазі-напівнеперервним знизу (кв.-нн.зн.)* в точці  $x_0 \in X$ , якщо для будь-якого  $b \in Y$  такого, що  $b \not\preceq_\Lambda f(x_0)$ , існує такий окіл  $\mathcal{D}(x_0)$  елемента  $x_0$  в сильній топології простору  $X$ , в якому  $b \not\preceq_\Lambda f(x) \quad \forall x \in \mathcal{D}(x_0)$ .

**Означення 10** ([4]). Відображення  $f: X \rightarrow Y^\bullet$  називається  $\Lambda_\tau$ -*напівнеперервним знизу* в точці  $x_0$  (відносно сильної топології простору  $X$ ), якщо  $f(x_0) \in \Lambda_\tau\text{-}\liminf_{x \rightarrow x_0} f(x)$ . Тут через  $\Lambda_\tau\text{-}\liminf_{x \rightarrow x_0} f(x)$  позначено  $\Lambda_\tau$ -нижню границю відображення  $f: X \rightarrow Y^\bullet$  в точці  $x_0 \in X$ , яка визначається за правилом

$$\Lambda_\tau\text{-}\liminf_{x \rightarrow x_0} f(x) := \begin{cases} L_{\min}^\mu(f, x_0), & L_{\min}^\mu(f, x_0) \neq \emptyset, \\ \Lambda_\tau\text{-}\text{Min } L^\mu(f, x_0), & L_{\min}^\mu(f, x_0) = \emptyset, \end{cases} \quad (4)$$

де

$$L_{\min}^\mu(f, x_0) := \{y^* \in L^\mu(f, x_0) : (y^* - \Lambda) \cap f(X) \in \{\emptyset, y^*\}\}. \quad (5)$$

Надалі будемо опускати індекс  $\tau$  в означенні  $\Lambda$ -нн.зн., маючи на увазі \*-слабку топологію простору  $Y$ .

**Означення 11.** Відображення  $f: X \rightarrow Y^\bullet$  називається *ск.нн.зн.* (відповідно, *кв.-нн.зн.* та  $\Lambda$ -нн.зн.) на  $X$ , якщо  $f$  ск.нн.зн. (відповідно, кв.-нн.зн. та  $\Lambda$ -нн.зн.) в кожній точці простору  $X$ .

Наведемо перелік найбільш вагомих результатів, які стосуються означених вище понять (див., напр., [4], [8], [10]).

1. Якщо  $Y = \mathbb{R}$  і  $\Lambda = \mathbb{R}_{\geq}$ , то поняття ск.нн.зн., кв.-нн.зн. та  $\Lambda$ -нн.зн. тотожні класичному означенню напівнеперервності знизу для скалярних функцій  $f: X \rightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ .
2. Якщо відображення  $f: X \rightarrow Y^{\bullet}$  — ск.нн.зн. в точці  $x_0 \in X$ , то воно є квазі-нн.зн. в цій точці.
3. Якщо відображення  $f$  ск.нн.зн. в точці  $x_0 \in X$ , то воно є  $\Lambda$ -нн.зн. в  $x_0$ .
4. Властивості  $\Lambda$ - та квазі-напівнеперервності знизу в точці  $x_0 \in X$  для відображення  $f$  не гарантують його секвенціальну напівнеперервність знизу в цій точці.
5. Відображення  $f$  є кв.-нн.зн. тоді і тільки тоді коли для кожного  $b \in Y$  множина  $\{x \in X: f(x) \leq b\}$  є сильно замкненою в  $X$ .
6. Надграфік секвенціально напівнеперервного знизу відображення  $f$  є секвенціально  $\mu$ -замкненим, проте обернене твердження, в загальному випадку, є хибним.
7. Якщо надграфік ерї  $f$  відображення  $f: X \rightarrow Y^{\bullet}$  є секвенціально  $\mu$ -замкненим, то  $f$  — кв.-нн.зн. відображення, проте обернене твердження справедливе лише за умови, коли конус  $\Lambda$  має непорожню внутрішність.

Таким чином, для довільного відображення  $f$  мають місце наступні співвідношення між наведеними концепціями секвенціальної напівнеперервності знизу та властивістю секвенціальної  $\mu$ -замкненості його надграфіка: " $\Lambda$ -нн.зн."  $\leftarrow$  "ск.нн.зн."  $\rightarrow$  "секвенціальна  $\mu$ -замкненість надграфіка"  $\stackrel{\text{int } \Lambda \neq \emptyset}{\Leftrightarrow}$  "кв.-нн.зн."

Для ілюстрації твердження з пункту 7, наведемо приклад квазі-напівнеперервного знизу відображення, надграфік якого не є замкненим.

**Приклад 1.** Нехай гільбертів простір  $l_2^*$  частково упорядковано за конусом невід'ємних елементів  $\Lambda = \{(x_1, x_2, \dots, x_n, \dots) \in l_2^* \mid x_i \geq 0, \forall i \in \mathbb{N}\}$ . Легко бачити, що конус  $\Lambda$  має порожню внутрішність як в сильній, так і в  $*$ -слабкій топології простору  $l_2^*$ . Розглянемо відображення  $f: \mathbb{R} \rightarrow l_2^*$ , яке задане правилом

$$f(x) = \begin{cases} 0_{l_2^*}, & |x| \geq 1, \\ \underbrace{(0, 0, \dots, 1, 0, \dots)}_n, & \frac{1}{2n+1} \leq |x| \leq \frac{1}{2n}, n \in \mathbb{N} \\ \left(\frac{1}{2}, 0, 0, \dots\right), & x = 0, \\ +\infty_{\Lambda}, & \text{в іншому випадку.} \end{cases} \quad (6)$$

Оскільки властивість кв.нн. знизу для  $f$  у точках  $x \neq 0$  є очевидною, то розглянемо випадок, коли  $x = 0$ . Покажемо, що в цьому випадку для довільного  $b \not\leq_{\Lambda} f(0) = \left(\frac{1}{2}, 0, 0, \dots\right)$  існує окіл точки  $0: \mathfrak{D}_n(0) = \left(-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right)$ , на якому  $b \not\leq_{\Lambda} f(\mathfrak{D}_n(0))$ . Дійсно, припустивши обернене, для довільного номера  $n_0 \in \mathbb{N}$  знайдеться елемент  $y_0 \in \left(-\frac{1}{n_0}, \frac{1}{n_0}\right)$  такий, що  $b \succeq_{\Lambda} f(y_0)$ . За побудовою маємо:  $f(y_0) = \underbrace{(0, 0, \dots, 1, 0, \dots)}_{n(y_0)}$ . Тоді знайдеться окіл  $\mathfrak{D}_{n_1}(0) = \left(-\frac{1}{n(y_0)+1}, \frac{1}{n(y_0)+1}\right)$  такий, що  $\underbrace{(0, 0, \dots, 1, 0, \dots)}_{n(y_0)} \notin f(\mathfrak{D}_{n_1}(0))$ . Отже в цьому околі повинна існувати точка  $y_1$  така, що  $f(y_1) = \underbrace{(0, 0, \dots, 1, 0, \dots)}_{n(y_1)} \leq_{\Lambda} b$ , де  $n(y_1) >$

$n(y_0)$ . Продовжуючи цей процес, приходимо до наступної послідовності елементів простору  $l_2^*$ :

$$\left\{ \underbrace{(0, 0, \dots, 1, 0, \dots)}_{n(y_i)} \right\}_{i=0,1,\dots} \quad \text{де } n(y_i) \rightarrow \infty \text{ при } i \rightarrow \infty. \quad (7)$$

Оскільки елемент  $b \in l_2^*$  повинен бути більшим за конусом  $\Lambda$  аніж усі елементи цієї послідовності, то це означає, що компоненти вектора  $b = (b_0, b_1, b_2, \dots)$  є невід'ємними числами та такими, що

$$b_{n(y_i)} \geq 1, \quad \forall i \in \mathbb{N}. \quad (8)$$

Об'єднуючи (7) та (8), отримуємо  $\limsup_{k \rightarrow \infty} b_k^2 \geq 1$ , що означає: ряд  $\sum_{k=1}^{\infty} b_k^2$  є розбіжним.

Отже, елемент  $b$  не належить простору  $l_2^*$ , тобто вихідне припущення було хибним. Таким чином, відображення  $f$  є кв.-нн.зн. на  $\mathbb{R}$ .

Тепер покажемо, що надграфік відображення  $f$  не є секвенціально  $\mu$ -замкненим в сенсі означення 1. Для цього розглянемо послідовність  $\left\{ \left( \frac{1}{2n}, f\left(\frac{1}{2n}\right) \right) \right\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \text{епі } f$ . Оскільки

$$\frac{1}{2n} \rightarrow 0 \text{ при } n \rightarrow +\infty, \quad f\left(\frac{1}{2n}\right) = \underbrace{(0, 0, \dots, 1, 0, \dots)}_n \xrightarrow{\tau} 0_{l_2^*} \text{ при } n \rightarrow +\infty,$$

то пара  $(0, 0_{l_2^*}) \in \mathbb{R} \times l_2^*$  є  $\mu$ -границею означеної послідовності. Проте  $0_{l_2^*} \not\prec_{\Lambda} f(0) = \left(\frac{1}{2}, 0, 0, \dots\right)$ . Отже,  $(0, 0_{l_2^*})$  не належить надграфіку відображення  $f$ , що і потрібно було встановити.

**Зауваження 1.** Відображення  $f$ , яке задане правилом (6), не є  $\Lambda$ -нн.зн. в точці 0. Дійсно, виходячи з означення нижньої границі (див. (4)), маємо  $\Lambda\text{-}\liminf_{x \rightarrow 0} f(x) = \{0_{l_2^*}\}$ .

Проте,  $f(0) = \left(\frac{1}{2}, 0, 0, \dots\right)$ . Таким чином, властивість квазі-напівнеперервності знизу для відображення  $f$  ще не гарантує його  $\Lambda$ -напівнеперервності знизу в цій точці.

**4. Поняття ері-напівнеперервності знизу.** Нехай  $f: X \rightarrow Y^\bullet$  — довільне відображення, і нехай простори  $X$  та  $Y$  наділені, відповідно, сильною та  $*$ -слабкою топологіями. Беручи до уваги означення 2 та конструкцію (2), введемо до розгляду наступне поняття:

**Означення 12.** Відображення  $f: X \rightarrow Y^\bullet$  будемо називати ері-напівнеперервним знизу (ері-нн.зн.) в точці  $x_0 \in X$ , якщо

$$f(x_0) = \inf_{\Lambda} L^\mu(f, x_0). \quad (9)$$

У випадку, коли співвідношення (9) виконується в усіх точках  $x_0$  простору  $X$ , будемо казати, що відображення  $f: X \rightarrow Y^\bullet$  є ері-нн.зн. на  $X$ .

**Зауваження 2.** Нехай  $Y = \mathbb{R}$  і  $\Lambda = \mathbb{R}_{\geq}$ . Тоді з (9) маємо

$$\inf_{\Lambda} L^\mu(f, x_0) = \liminf_{x \rightarrow x_0} f(x). \quad (10)$$

Отже, в скалярному випадку поняття ері-нн.зн. еквівалентне поняттю класичної секвенціальної напівнеперервності знизу. Таким чином, внаслідок зазначених вище властивостей, усі чотири наведених в роботі концепції напівнеперервності знизу (ск.нн.зн., кв.-нн.зн.,  $\Lambda$ -нн.зн., та ері-нн.зн.) збігаються у скалярному випадку.

До характерних властивостей ері-нн.зн. відображень варто віднести наступні (див теореми 1 та 2), які не мають свого прямого аналогу для відображень іншого типу.

**Теорема 1.** Нехай  $f: X \rightarrow Y^\bullet$  — довільне відображення, надграфік якого ері  $f \in$  секвенціально  $\mu$ -замкненою підмножиною в  $X \times Y$ . Тоді  $f: X \rightarrow Y^\bullet$  — ері-нн.зн. на  $X$ .

*Доведення.* Припустимо обернене. Тоді знайдеться точка  $x_0 \in X$  така, що

$$f(x_0) \neq \inf_{\Lambda} L^{\mu}(f, x_0). \quad (11)$$

Це означає, що можна вказати послідовність  $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset X$ , для якої справедливо наступне:

$$x_n \rightarrow x_0, \quad f(x_n) \xrightarrow{\tau} f^*, \quad f^* \not\leq_{\Lambda} f(x_0). \quad (12)$$

За побудовою маємо:  $(x_n, f(x_n)) \in$  ері  $f$  для всіх  $n \in \mathbb{N}$ . При цьому  $(x_n, f(x_n)) \xrightarrow{\mu} (x_0, f^*)$ . Проте, як випливає з (12),  $(x_0, f^*) \notin$  ері  $f$ , що суперечить  $\mu$ -замкненості надграфіка. Отже, зроблене припущення було хибним, що і доводить теорему.  $\square$

Введемо ряд допоміжних понять.

**Означення 13.** Відображення  $f: X \rightarrow Y^\bullet$  будемо називати *локально обмеженим знизу за конусом*  $\Lambda$ , якщо для будь-якої точки  $x_0 \in X$  знайдуться окіл  $\mathfrak{D}(x_0)$  та елемент  $b \in Y$  такі, що  $b \preceq_{\Lambda} f(x)$ ,  $\forall x \in \mathfrak{D}(x_0)$ .

**Означення 14** ([3]). Норму  $\|\cdot\|_Y$  в просторі  $Y$  називають  $\Lambda$ -*монотонною*, якщо для довільних елементів  $y, z \in Y$  з нерівності  $0_Y \preceq_{\Lambda} y \preceq_{\Lambda} z$  випливає  $\|y\|_Y \leq \|z\|_Y$ .

**Означення 15** ([6]). Нехай  $\Theta$  — непорожня підмножина дійсного лінійного простору  $Z$ . Тоді

$$\text{co}(\Theta) := \{\bar{y} \in \Theta \mid \forall y \in Z \exists \bar{\alpha} > 0: \bar{y} + \alpha y \in \Theta, \forall \alpha \in [0, \bar{\alpha}]\} \quad (13)$$

називають *алгебраїчною внутрішністю множини*  $\Theta$ .

**Твердження 1.** Нехай дійсний нормований простір  $Y$  частково упорядковано за конусом  $\Lambda$ , який має непорожню алгебраїчну внутрішність. Тоді в просторі  $Y$  знайдеться послідовність  $\{b_n\}_{n=1}^{\infty} \subset Y$ , для якої виконується тотожність

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} (b_n + \Lambda) = Y. \quad (14)$$

*Доведення.* Нехай  $b_0$  — довільний представник множини  $\text{co} \Lambda$ . Побудуємо послідовність  $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$  за правилом

$$b_n = -n \cdot b_0, \quad n \in \mathbb{N}. \quad (15)$$

Виходячи з вихідних припущень та означення 15, для довільного  $y \in Y$  знайдеться число  $\bar{\alpha} > 0$  таке, що  $b_0 + \alpha \cdot y \in \Lambda$  для всіх  $\alpha \in [0, \bar{\alpha}]$ . Отже, має місце наступна імплікація

$$b_0 + \alpha \cdot y \succeq_{\Lambda} 0_Y \implies \alpha \cdot y \succeq_{\Lambda} -b_0 \implies n \cdot \alpha \cdot y \succeq_{\Lambda} -n \cdot b_0 \quad \forall n \in \mathbb{N}. \quad (16)$$

В силу довільності  $n$ , знайдеться  $n_0$ , для якого  $\frac{1}{n_0} \in [0, \bar{\alpha}]$ . Звідси отримуємо

$$y \succeq_{\Lambda} -n_0 \cdot b_0, \quad (17)$$

а отже  $y \succeq_{\Lambda} -n \cdot b_0 \quad \forall n \geq n_0$ , що і потрібно було встановити.  $\square$

**Твердження 2.** Нехай виконуються припущення твердження 1. Тоді будь-яке ері-нн.зн. відображення  $f: X \rightarrow Y^\bullet$  є локально обмеженим знизу за конусом.

*Доведення.* Припустимо обернене, а саме існує точка  $x_0 \in X$ , в околі якої відображення  $f$  не є обмеженим знизу за конусом  $\Lambda$ . Тоді для будь-якого околу  $\mathfrak{D}_n(x_0)$  точки  $x_0$  та довільного  $b \in Y$  знайдеться елемент  $x_n \in \mathfrak{D}_n(x_0)$ , для якого  $f(x_n) \not\leq_\Lambda b$ . Побудуємо послідовність  $\{b_n\}_{n=1}^\infty \subset Y$  за правилом (15). Нехай  $\{\mathfrak{D}_n(x_0)\}_{n=1}^\infty$  — монотонна (за включенням  $\mathfrak{D}_{n+1}(x_0) \subset \mathfrak{D}_n(x_0)$ ) послідовність околів точки  $x_0$ , яка задовольняє умову  $\mathfrak{D}_n(x_0) \rightarrow \{x_0\}$  при  $n \rightarrow \infty$  (в сенсі Куратовського).

В силу вихідних припущень, для кожного  $n \in \mathbb{N}$  знайдеться точка  $x_n \in \mathfrak{D}_n(x_0)$ , для якої  $f(x_n) \not\leq_\Lambda b_n$ . Ясно, що послідовність  $\{x_n\}_{n=1}^\infty$  збігається до  $x_0$ . Проте відповідна послідовність  $\{f(x_n)\}_{n=1}^\infty$  не є обмеженою знизу за конусом. Дійсно, якщо б існував елемент  $y^* \in Y$  такий, що  $y^* \leq_\Lambda f(x_n) \forall n \in \mathbb{N}$ , то за побудовою послідовності  $\{b_n\}_{n=1}^\infty$  знайдеться номер  $n_0$ , при якому  $b_n \leq_\Lambda y^*$  для всіх  $n > n_0$ . З цього випливає, що  $f(x_n) \not\leq_\Lambda y^*$ . Отже, послідовність  $\{f(x_n)\}_{n=1}^\infty$  не обмежена знизу за конусом. Це означає, що її границею є невластий елемент  $-\infty_\Lambda$ . Проте цей факт суперечить властивості ері-нн.зн. відображення  $f$ . Тим самим твердження доведено.  $\square$

Всюди далі в даній роботі будемо вважати, що конус  $\Lambda$ , який задає частковий порядок на просторі  $Y$ , має непорожню алгебраїчну внутрішність.

**Теорема 2.** Нехай норма  $\|\cdot\|_Y$  простору  $Y$  є  $\Lambda$ -монотонною. Нехай  $f: X \rightarrow Y^\bullet$  — ері-нн.зн. відображення. Тоді його надграфік  $\text{epi } f$  є секвенціально  $\mu$ -замкненою підмножиною в  $X \times Y$ .

**Зауваження 3.** Умова монотонності норми не є надто обмежливим припущенням. Наприклад, нехай на просторах  $C(\Omega)$  та  $L^p(\Omega)$  при  $p \leq 2$ , де  $\Omega$  — обмежена відкрита множина, задано частковий порядок, який породжено відповідними конусами  $\Lambda$  невід'ємних елементів. Тоді норми в цих просторах є  $\Lambda$ -монотонними (див., напр., [6]).

*Доведення.* Припустимо обернене, а саме, нехай за зроблених припущень множина ері  $f$  не є секвенціально  $\mu$ -замкненою. Тоді

$$\exists \{(x_n, y_n)\}_{n \in \mathbb{N}} \in \text{epi } f \quad \text{така, що} \quad (x_n, y_n) \xrightarrow{\mu} (x_0, y_0) \notin \text{epi } f. \quad (18)$$

Отже, розкриваючи зміст виразу (18), маємо:

$$x_n \rightarrow x_0 \text{ сильно в } X, \quad y_n \xrightarrow{\tau} y_0 \text{ в } Y; \quad (19)$$

$$f(x_n) \leq_\Lambda y_n, \quad \text{для всіх } n \in \mathbb{N}; \quad (20)$$

$$f(x_0) \not\leq_\Lambda y_0. \quad (21)$$

В силу (19)<sub>2</sub>, послідовність  $\{y_n\}_{n \in \mathbb{N}}$  є обмеженою за нормою простору  $Y$ , тобто

$$\exists c > 0: \sup_{n \in \mathbb{N}} \|y_n\|_Y \leq c. \quad (22)$$

Окрім цього, беручи до уваги збіжність (19)<sub>1</sub> та обмеженість знизу за конусом  $\Lambda$  (див. твердження 2), маємо: існує елемент  $b \in Y$  та номер  $n_0$  такі, що

$$b \leq_\Lambda f(x_n), \quad \forall n > n_0. \quad (23)$$



Тоді  $\Lambda$ -монотонність норми простору  $Y$  та нерівності (23), (18) і (20) забезпечують обмеженість послідовності  $\{f(x_n)\}_{n=n_0}^{\infty}$  за нормою простору  $Y$ . В результаті, залучивши теорему Банаха-Алаоглу, з послідовності  $\{f(x_n)\}_{n=n_0}^{\infty}$  можна виділити  $\tau$ -збіжну підпослідовність (збережемо для неї попередні позначення). Нехай  $f^*$  є  $\tau$ -границею обраної підпослідовності. За побудовою маємо  $f^* \in L^\mu(f, x_0)$ . Оскільки  $\Lambda$  — замкнений опуклий конус, то перейшовши в (20) до границі при  $n \rightarrow \infty$ , отримаємо  $f^* \preceq y_0$ , що в купі з (21) дає:  $f(x_0) \not\preceq f^*$ . Отже,  $f(x_0) \neq \inf_{\Lambda} L^\mu(f, x_0)$ , що суперечить припущенню щодо ері-нн.зн. відображення  $f$  в точці  $x_0$ . Тим самим, теорема доведена.  $\square$

**5. Порівняльний аналіз концепцій напівнеперервності.** Проведемо тепер порівняльний аналіз наведених в роботі понять напівнеперервності знизу та ері-напівнеперервності знизу. Як і раніше, будемо вважати, що банахів простір  $Y$  наділено  $*$ -слабкою топологією  $\tau$  і частково упорядковано опуклим загостреним  $\tau$ -замкненим конусом  $\Lambda$ . Нехай  $f: X \rightarrow Y^\bullet$  — довільне відображення, та нехай  $x_0$  — довільна точка множини  $X$  така, що  $f(x_0) \prec_{\Lambda} +\infty_{\Lambda}$ .

**Теорема 3.** *Якщо відображення  $f: X \rightarrow Y^\bullet$  є ск.нн.зн. в точці  $x_0$ , то  $f$  є ері-нн.зн. в цій точці.*

*Доведення.* Припустимо обернене, а саме, нехай  $f$  не є ері-нн.зн. в точці  $x_0$ . В цьому випадку маємо:  $f(x_0) \neq \inf_{\Lambda} L^\mu(f, x_0)$ . Отже, існує послідовність  $\{x_n^*\}_{n \in \mathbb{N}} \subset X$ , яка збігається до  $x_0$ , і така, що відповідна їй послідовність значень  $\{f(x_n^*)\}_{n \in \mathbb{N}}$  буде  $\tau$ -збігатися до  $f^* \in Y$ , де  $f^* \not\preceq_{\Lambda} f(x_0)$ .

Проте, за означенням секвенціальної напівнеперервності знизу в точці  $x_0$ , маємо: для довільного  $y \preceq_{\Lambda} f(x_0)$  і для будь-якої послідовності  $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} \in X$ , яка сильно збігається до  $x_0$ , існує  $\tau$ -збіжна до  $y$  послідовність  $\{y_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset Y$ , яка задовольняє умову  $y_n \preceq_{\Lambda} f(x_n)$ ,  $\forall n \in \mathbb{N}$ .

Нехай  $y = f(x_0)$  і нехай  $\{x_n = x_n^*\}_{n \in \mathbb{N}}$ . Тоді  $x_n \rightarrow x_0$ . Проте, для будь-якої  $\tau$ -збіжної послідовності  $\{y_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset Y$ , яка задовольняє умову  $y_n \preceq_{\Lambda} f(x_n) \forall n \in \mathbb{N}$ , її границя буде меншою за конусом ніж  $f^*$  (див. [3]). Разом з тим,  $y \not\preceq_{\Lambda} f^*$ . Отже, не має жодної  $\tau$ -збіжної до  $y$  послідовності  $\{y_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset Y$ , яка б задовольняла умову  $y_n \preceq_{\Lambda} f(x_n)$ ,  $\forall n \in \mathbb{N}$ . Тим самим, порушується секвенціальна напівнеперервність знизу відображення  $f$  в точці  $x_0$ . Таким чином, вихідне припущення було хибним, що і доводить теорему.  $\square$

Зауважимо, що в загальному випадку обернене твердження до теореми 3 є хибним, тобто з ері-нн.зн. відображення  $f$  не випливає властивість ск.нн.зн. Наведемо тепер умови, за яких має місце імплікація: ері-нн.зн.  $\Rightarrow$  кв.-нн.зн..

**Теорема 4.** *Нехай норма  $\|\cdot\|_Y$  простору  $Y$  є  $\Lambda$ -монотонною. Нехай  $f: X \rightarrow Y^\bullet$  — ері-нн.зн. в точці  $x_0 \in X$  відображення. Тоді  $f: X \rightarrow Y^\bullet$  є квазі-напівнеперервним знизу в  $x_0 \in X$ .*

*Доведення.* Припустимо обернене, а саме нехай за зроблених припущень відображення  $f: X \rightarrow Y^\bullet$  не задовольняє умову кв.-нн.зн. в точці  $x_0 \in X$ . Тоді знайдеться елемент  $b \in Y$  такий, що  $b \not\preceq_{\Lambda} f(x_0)$  і в будь-якому околі точки  $x_0$  існує елемент  $x^*$ , на якому  $b \succeq_{\Lambda} f(x^*)$ . Звідси випливає, що можна вибрати збіжну до  $x_0$  послідовність  $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ , для якої відповідна послідовність значень  $\{f(x_n)\}_{n \in \mathbb{N}}$  є меншою за конусом ніж елемент  $b$ . Із локальної обмеженості знизу відображення  $f$  (див. твердження 2) випливає, що послідовність  $\{f(x_n)\}_{n \in \mathbb{N}}$  є обмеженою знизу за конусом. Враховуючи властивість монотонності норми простору  $Y$  це означає, що послідовність  $\{f(x_n)\}_{n \in \mathbb{N}}$  обмежена за нормою

простору  $Y$ . Тоді, за теоремою Банаха-Алаоглу, з неї можна виділити підпослідовність  $\{f(x_{n_i})\}_{i \in \mathbb{N}}$  таку, що  $f(x_{n_i}) \xrightarrow{\tau} f^*$ . Проте, границя цієї підпослідовності  $f^*$  буде не більшою за конусом ніж  $f(x_0) : f^* \not\leq_{\Lambda} f(x_0)$ . Отже  $f(x_0) \neq \inf_{\Lambda} L^{\mu}(f, x_0)$ , що суперечить ері-напівнеперервності знизу відображення  $f$  в точці  $x_0 \in X$ . Таким чином, зроблене припущення було хибним, що і доводить теорему.  $\square$

Насамкінець, порівняємо властивості ері- та  $\Lambda$ -напівнеперервності знизу.

**Теорема 5.** З ері-нн.зн. відображення  $f: X \rightarrow Y^{\bullet}$  випливає його  $\Lambda$ -нн.зн.

*Доведення.* Нехай  $L_{\min}^{\mu}(f, x_0) \neq \emptyset$ . Тоді, за означенням множини  $L_{\min}^{\mu}(f, x_0)$  (див. (5)) та властивістю ері-нн.зн. в точці  $x_0 \in X$  відображення  $f$ , маємо:

$$L_{\min}^{\mu}(f, x_0) = \inf_{\Lambda} L^{\mu}(f, x_0) = f(x_0).$$

Внаслідок локальної обмеженості знизу вихідного відображення (див. твердження 2), виконується умова:  $\inf_{\Lambda} L^{\mu}(f, x_0) \neq -\infty_{\Lambda}$ . Оскільки елемент  $f(x_0)$  є точною нижньою межею множини  $L^{\mu}(f, x_0)$ , то він є ефективним мінімумом замикання цієї множини (див. означення 2 та 6). Отже,  $f(x_0) \in \Lambda_{\tau}\text{-Min } L^{\mu}(f, x_0)$ . Таким чином

$$f(x_0) \in \Lambda_{\tau}\text{-}\liminf_{x \xrightarrow{\sigma} x_0} f(x) := \begin{cases} L_{\min}^{\mu}(f, x_0), & L_{\min}^{\mu}(f, x_0) \neq \emptyset, \\ \Lambda_{\tau}\text{-Min } L^{\mu}(f, x_0), & L_{\min}^{\mu}(f, x_0) = \emptyset, \end{cases},$$

що і доводить  $\Lambda$ -нн.зн. відображення  $f$  в точці  $x_0$ .  $\square$

Обернене твердження до теореми 5 є хибним в загальному випадку. Для ілюстрації цього факту наведемо такий приклад:

**Приклад 2.** Нехай  $Y = \mathbb{R}^2$ ,  $\Lambda = \mathbb{R}_{\geq}^2$ , а відображення  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$  задане правилом

$$f(x) = \begin{bmatrix} -x \\ 2 \end{bmatrix}, \quad \text{якщо } x \in [-3, -1), \quad f(-1) = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad f(x) = +\infty_{\Lambda} \text{ інакше.}$$

Як показано в роботі [4], це відображення є  $\Lambda$ -нн.зн. на  $\mathbb{R}$ . Проте легко бачити, що воно втрачає властивість ері-нн.зн. в точці  $x_0 = -1$ , оскільки

$$\inf_{\Lambda} L^{\mu}(f, -1) = \inf_{\Lambda} \left\{ \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \right\} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \neq f(-1).$$

**6. Властивості ері-нн.зн. відображень.** Метою даного розділу є отримати умови, за яких ері-нн.зн. відображення утворюють конус в просторі відображень  $F = \{f: X \rightarrow Y^{\bullet}\}$ , де  $X$  — дійсний нормований простір, а  $Y$  — банахів простір, який наділено  $*$ -слабкою топологією  $\tau$  і частково упорядковано опуклим загостреним  $\tau$ -замкненим конусом  $\Lambda$ . Для цього достатньо показати, що добуток довільного додатнього дійсного числа на ері-нн.зн. відображення та сума двох ері-нн.зн. відображень є ері-нн.зн. відображеннями.

**Твердження 3.** Нехай  $f: X \rightarrow Y^{\bullet}$  — ері-нн.зн. на  $X$  відображення. Тоді для будь-якого дійсного числа  $\alpha > 0$  відображення  $\alpha f$  є також ері-нн.зн. на  $X$ .

*Доведення.* За вихідними припущеннями маємо:  $f(x) = \inf_{\Lambda} L^{\mu}(f, x) \forall x \in X$ . Це означає, що  $f(x) \preceq_{\Lambda} f^*$ ,  $\forall f^* \in L^{\mu}(f, x)$ . Отже,  $\alpha f(x) \preceq_{\Lambda} \alpha f^*$ ,  $\forall f^* \in L^{\mu}(f, x)$ , та  $\forall \alpha > 0 \in \mathbb{R}$ . Зауваживши при цьому, що  $L^{\mu}(\alpha f, x) = \alpha L^{\mu}(f, x)$ , отримуємо:  $\alpha f(x) \preceq_{\Lambda} g$ ,  $\forall g \in L^{\mu}(\alpha f, x)$ ,  $\forall \alpha > 0 \in \mathbb{R}$ . Таким чином,  $\alpha f$  є ері-нн.зн. відображенням, що і потрібно було встановити.  $\square$

**Твердження 4.** Нехай норма  $\|\cdot\|_Y$  простору  $Y$  є  $\Lambda$ -монотонною. Тоді сума двох ері-нн.зн. відображень є ері-нн.зн. відображенням.

*Доведення.* Припустимо обернене. Тоді знайдуться ері-нн.зн. відображення  $f: X \rightarrow Y^{\bullet}$  та  $g: X \rightarrow Y^{\bullet}$  такі, що  $(f+g)(x_0) \neq \inf_{\Lambda} L^{\mu}(f+g, x_0)$ . Отже існує послідовність  $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset X$  з наступними властивостями:

$$x_n \rightarrow x_0, \quad (f+g)(x_n) \xrightarrow{\tau} h^*, \quad (24)$$

$$h^* \not\preceq_{\Lambda} (f+g)(x_0) = f(x_0) + g(x_0). \quad (25)$$

При цьому є можливими два випадки: або послідовності  $\{f(x_n)\}_{n \in \mathbb{N}}$  та  $\{g(x_n)\}_{n \in \mathbb{N}}$  є одночасно  $\tau$ -збіжними, або ці послідовності  $\tau$ -розбігаються. Розглянемо перший з них. Тоді, за ері-напівнеперервністю знизу відображень  $f$  та  $g$ , маємо:

$$h^* = \tau - \lim_{x_n \xrightarrow{\sigma} x_0} f(x_n) + \tau - \lim_{x_n \xrightarrow{\sigma} x_0} g(x_n) \succeq_{\Lambda} f(x_0) + g(x_0),$$

що суперечить (25).

Розглянемо тепер другий випадок, а саме, нехай обидві послідовності  $\{f(x_n)\}_{n \in \mathbb{N}}$ ,  $\{g(x_n)\}_{n \in \mathbb{N}}$   $\tau$ -розбігаються, проте їх сума  $\{(f+g)(x_n)\}_n$   $\tau$ -збігається до елемента  $h^*$ . Якщо при цьому хоча б одна з послідовностей  $\{f(x_n)\}_{n \in \mathbb{N}}$  або  $\{g(x_n)\}_{n \in \mathbb{N}}$  є необмеженою за нормою простору  $Y$ , то з  $\Lambda$ -монотонності норми простору  $Y$  та локальної обмеженості знизу за конусом відображень  $f$  та  $g$  (див. твердження 2) впливає, що послідовність  $\{(f+g)(x_n)\}_n$  також буде необмеженою за нормою. А отже, вона не буде  $\tau$ -збіжною, що суперечить (24). Таким чином, обидві з послідовностей  $\{f(x_n)\}_{n \in \mathbb{N}}$  та  $\{g(x_n)\}_{n \in \mathbb{N}}$  є обмеженими в просторі  $Y$ . Тоді, за теоремою Банаха-Алаоглу знайдеться підпослідовність  $\{x_{n_k}\}_{k \in \mathbb{N}} \subset \{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$  така, що відповідні послідовності  $\{f(x_{n_k})\}_{k \in \mathbb{N}}$  та  $\{g(x_{n_k})\}_{k \in \mathbb{N}}$  будуть  $*$ -слабо збіжними. Отже, внаслідок (24),  $\tau$ -границею підпослідовності  $\{(f+g)(x_{n_k})\}_{k \in \mathbb{N}}$  буде також елемент  $h^*$ . Тоді

$$h^* = \tau - \lim_{k \rightarrow \infty} (f(x_{n_k}) + g(x_{n_k})) = \tau - \lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) + \tau - \lim_{k \rightarrow \infty} g(x_{n_k}) \succeq_{\Lambda} (f(x_0) + g(x_0)), \quad (26)$$

що знову ж суперечить (25). Таким чином, вихідне припущення було хибним, що і потрібно було показати.  $\square$

## ЛІТЕРАТУРА

1. Когут П.І., Нечай І.В. До питання регуляризації задач векторної оптимізації// Вісник ДНУ, Сер. Математика. – 2008. – Т.16, №6/1. – С. 149–154.

2. Когут П.І., Нечай І.В. *Про скаляризацію одного класу задач векторної оптимізації в банахових просторах*// Проблемы управления и информатики. – 2008. – Т.6. – С. 42–56.
3. Красносельский М.А., Лифшиц Е.А., Соболев А.В. *Позитивные линейные системы: метод положительных операторов*. – М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1985. – 256 с.
4. Нечай І.В. *Про розв'язність та регуляризацію задач нескалярної оптимізації в банахових просторах* Дис. ... к.ф.-м.н. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2009.
5. Finet C., Quarta L., Troestler C. *Vector-value Variational Principles* Preprint #4, January 19, Institute de Mathématique et d'Informatique, Université de Mons-Hainaut, 2001.
6. Jahn J. *Vector Optimization. Theory, Applications, and Extensions* – Springer-Verlag, Berlin, 2004.
7. Kogut P.I., Manzo R., Nechay I.V. *Topological aspects of scalarization in vector optimization problems*// Australian Journal of Mathematical Analysis and Applications. – 2010. – V.7, №2. – P. 1–24.
8. Luc D.T. *Theory of Vector Optimization*, Springer-Verlag, New York, 1989.
9. Mansour M.A., Metrane A., Théra M. *Lower semicontinuous regularization for vector-valued mappings*, Rapport de recherche, Université de Limoges, 2004.
10. Penot J.P., Théra M. *Semicontinuous mappings in general topology*// Arch. Math. – 1982. – V.38. – P. 158–166.

Дніпропетровський національний університет,  
механіко-математичний факультет,  
p.kogut@i.ua

Надійшло ?